

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 27-3-72 293539

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

22 MARS 1972.

ABONNEMENT ANNUEL  
25 F

BULLETIN N° 138  
Supplément n° 1

### TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER.

### CULTURES FRUITIÈRES

Les projections d'ascospores augmentent rapidement. Une situation plus humide accentuera encore le volume de ces projections. Par ailleurs, la végétation a été favorisée par les températures élevées de ces derniers jours. Il est conseillé d'appliquer un traitement sur toutes les variétés ayant atteint le stade C 3 D.

- **MONILIA DE L'ABRICOTIER** : Un 2ème traitement doit intervenir à la chute des pétales.
- **MONILIA DU PRUNIER ET DU CERISIER** : Pour le Prunier, intervenir dès que la majorité des boutons commencent à se séparer dans l'inflorescence. Pour le Cerisier, traiter entre le stade début de séparation des boutons et l'ouverture des premières fleurs. Utiliser un produit cuprique, 250 g. de cuivre / hl ou un organique de synthèse : Carbatène, Folpel, Mancozèbe, Thirame, (doses Tavelures) ou Bénomyl 30 g., Thiabendazole 100 g. m. a. / hl. Sur Prunier, ce traitement est valable contre la Cloque ou maladie des pochettes.
- **OIDIUM DU POMMIER** : Premières manifestations de la maladie. Supprimer les pousses oïdiées. Assurer la protection des jeunes organes.
- **ACARIENS - PUCERONS - PSYLLES** : Sortie des femelles de l'araignée jaune en situations favorables. Premiers foyers de Puceron brun du Pêcher. Pontes parfois importantes de Psylles du Poirier. Éclosions localement très proches.

### CULTURES LÉGUMIÈRES

- **PUCERON JAUNE DU FRAISIER** : Ce puceron, vecteur de virus, doit être combattu dès son apparition. De plus, un traitement hâtif, évite en grande partie la destruction des auxiliaires.
- **TEIGNE DU POIREAU** : Début de reprise d'activité des adultes.
- **MOUCHE DES SEMIS** : Les jeunes plants de Haricot sont particulièrement sensibles aux attaques de cet insecte. Les dégâts sont d'autant plus graves que la levée est plus lente. Les attaques sont en relation avec la teneur du sol en matières organiques, surtout si elles sont mal décomposées.

L'enrobage des semences qui assure une protection pendant 10 - 12 jours est généralement suffisant. Les produits suivants peuvent être utilisés : Diazinon, Trichloronate 1 g., Carbophenothion 1,25 g., Diéthion 1,5 g., de m. a. par kg de graines. Si les conditions de semis font craindre une levée lente (2 semaines ou plus), il est préférable de compléter l'enrobage par une pulvérisation des rangs après semis avec : Diazinon 160 g., Chlorfenvinphos 120 g., Parathion 72 g., Trichloronate 50 g. de m. a. / hl à raison de 1 litre de bouillie pour environ 10 - 15 m. de raie sur 0m,20 à 0m,30 de largeur. Dans tous les cas, choisir un produit différent de celui employé pour le traitement des graines.

### GRANDES CULTURES

- **ALTISES DES CRUCIFÈRES ET DU LIN**. L'enrobage des graines avant semis avec une spécialité à haute teneur en Lindane permet de limiter les dégâts à la germination.
- **MELIGETHES DU COLZA**. Les dégâts sont les plus à craindre lorsque les boutons sont encore groupés.

P274

- ABONNEMENT.-

Nous rappelons que le montant de l'abonnement aux Avertissements Agricoles est de  
.... 25 Frs par an.

Les versements peuvent être effectués :

par virement au C.C.P. Régisseur Recettes- D.D.A. - Protection des Végétaux  
n° 9063-96 PARIS.

par chèque bancaire à l'ordre de : Régisseur Recettes - D.D.A. - Protection des  
Végétaux.

L'Ingénieur et le Technicien  
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

Le Chef de la Circonscription  
de la Région Parisienne,

R. SARRAZIN.

Dernière note : Bulletin n° 138 - 8 MARS 1972.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.  
47, Av. Paul Doumer - 93 - MONTREUIL-Ss-BOIS.